

疫苗信息

在签署同意书前请仔细阅读下面的信息。如需了解更多信息, 请访问healthywa.wa.gov.au/immunisation

	人乳头瘤病毒 (HPV)	白喉-破伤风-百日咳 (dTpa)
这是什么疾病?	<p>人乳头瘤病毒 (HPV) 是一种常见病毒, 会对所有性别的人造成影响。HPV 传染性极高, 90% 性行为活跃人士都会在其人生的某个时候感染 HPV。人体通常会自然地清除感染, 而且大部分类型的 HPV 都不会引发任何症状。不过, 某些类型的 HPV 会引发生殖器疣, 同时某些类型的这种病毒会存活在人体内, 经年累月就会在子宫颈、生殖器区域 (阴道、外阴、阴茎)、肛门以及口腔和喉咙部位引发癌症。</p>	<p>白喉 是一种具有传染性的, 并且可能会危及生命的细菌感染, 它能引发严重的呼吸困难、心脏衰竭和神经受损。</p> <p>破伤风 是一种严重的、往往致命的细菌性疾病, 它会对神经系统造成影响。感染破伤风的人会出现极其痛苦的肌肉痉挛、抽搐和牙关紧闭。这些痉挛会影响整个身体, 造成窒息和心脏衰竭。即使采用现代的重症监护手段, 感染破伤风的死亡率为五分之一。</p> <p>百日咳, 又称为吼叫式咳嗽, 是一种传染性极高的呼吸系统疾病, 会危及婴儿的生命。6 个月以下感染百日咳的婴儿中, 每 125 个中大约会有一个死于肺炎或大脑损伤。罹患百日咳的青少年和成年人会出现类似感冒的症状, 并且会剧烈咳嗽长达三个月。</p>
这种疾病是如何传播的?	<p>HPV 是在与携带这种病毒的人进行性活动时, 通过生殖器皮肤与生殖器皮肤的接触而传播。HPV 病毒极其微小, 可以穿透皮肤上细小的裂缝。它不是通过血液传播的。安全套对 HPV 的预防作用有限, 因为它们无法完全覆盖生殖器皮肤。</p>	<p>白喉 细菌可以生存在受感染者的口腔、鼻腔、喉咙或皮肤上。受感染者咳嗽或打喷嚏后, 如果其中的细菌被他人吸入, 就有可能感染白喉。如果与受感染者口腔、鼻腔、喉咙或皮肤的排出物有过密切接触, 也会感染白喉。</p> <p>破伤风 是由存在于泥土和粪肥中的细菌引发。这种细菌可以通过针刺般小的伤口进入人体。破伤风不会通过人传人传播。</p> <p>百日咳 或吼叫式咳嗽非常容易传播, 当受感染者咳嗽或打喷嚏时会将细菌排入空气中, 如果被附近的其他人吸入就有可能受到感染。如不进行治疗, 百日咳患者在出现症状后最长三个星期内都有可能感染其他人。</p>

	人乳头瘤病毒(HPV)	白喉-破伤风-百日咳(dTpa)
<p>疫苗安全而有效吗?</p>	<p>是的,自2007年以来,世界各地已接种超过3.5亿剂HPV疫苗,它得到世界卫生组织的推荐,该疫苗安全且耐受性良好。在较年轻时接种HPV疫苗,免疫效果最佳,因为这个年龄段的免疫反应最强烈,在性活动开始前接种效果最大。在预防会导致癌症和生殖器疣的主要类型的HPV感染方面,HPV疫苗的有效率为85-100%。已接种HPV疫苗的所有女性以及具有子宫颈的人仍然需要定期进行宫颈癌筛查,因为这种疫苗并不覆盖每一种类型的HPV。</p> <p>近期的国际和临床证据显示,一剂HPV疫苗就能带来极佳的预防效果。</p>	<p>dTpa疫苗能非常有效地预防白喉和破伤风,预防百日咳的有效率为80%。</p> <p>与儿童早期接种的疫苗相比,这种疫苗加强针的白喉和百日咳组分浓度较低。这种疫苗加强针安全且耐受性良好。</p>
<p>可能会出现哪些副作用?出现副作用时我们该怎么办?</p>	<p>常见副作用</p> <p>手臂上注射针口位置会出现疼痛/变红/瘙痒/小肿块。</p> <p>如需缓解,可在受影响部位敷贴一块清凉、湿润的布料。</p> <p>较不常见副作用</p> <p>低烧、感觉不适、恶心、头疼。</p> <p>如需缓解,受感染者可按产品说明书指示服食扑热息痛,同时多喝水。如果发烧不退,请与您的家庭医生问诊。</p> <p>极其罕见副作用</p> <p>有可能出现严重的反应,但非常罕见。相关示例包括面部肿胀或呼吸困难。与任何药品一样,疫苗导致严重损伤或死亡的可能性非常低。</p> <p>如果不良反应比较严重或者持续不消退,请立即就医并联系您当地的医院。</p>	<p>常见副作用</p> <p>轻度发烧(38°C以下)</p> <p>如需缓解,可按产品说明书指示服食扑热息痛,同时多喝水。</p> <p>如果发烧不退,请与GP面诊。</p> <p>手臂上注射针口位置会出现疼痛/变红/瘙痒/小肿块。</p> <p>如需缓解,可在受影响部位敷贴一块清凉、湿润的布料。</p> <p>极其罕见副作用</p> <p>臂丛神经炎(手臂神经发炎,导致无力或麻痹)。</p> <p>有可能出现严重的反应,但非常罕见。相关示例包括面部肿胀或呼吸困难。与任何药品一样,疫苗导致严重损伤或死亡的可能性非常低。</p> <p>如果不良反应比较严重或者持续不消退,请立即就医并联系您当地的医院。</p>